


SEBÁLLAPOT FELMÉRŐ LAP

Beteg neve:

TAJ:

Decubitus lokalizáció:



1. Tarkócsont
2. Lapocka
3. Processus spinosus (csigolya)
4. Könyök
5. Csípőtaréj
6. Keresztcsont
7. Ülőcsont
8. Achilles-ín
9. Sarok
10. Talp
11. Fül
12. Váll
13. Elülső sípcsonttüske
14. Tompor
15. Comb
16. Belső térd
17. Külső térd
18. Lábszár
19. Belboka
20. Külboka
21. A lábfej külső éle
22. A térd hátsó felszíne

J: jobb oldal

B: bal oldal

M: mindkét oldal

| | | DECUBITUS RIZIKÓ FELMÉRÉS (Bővített Norton-skála) | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| | | Kooperációs készség, motiváció | Élet- kor | Bőr állapota | Kísérő betegségek | Általános állapot | Mentális státusz | Aktivitás | Mobilitás | Inkontinen- cia | | |
| apótváltozás dátumai | | Jó (4) | 10 év alatt (4) | Ép,sértetle n (4) | Nincs (4) | Jó (4) | Éber (4) | Járóképes (4) | teljes (4) | nincs (4) | Összes pontszám: | |
| | | Kissé csökkent (3) | 11-30 év 3 | Száraz, hámlo (3) | Könnyebb (3) | Kielégítő (3) | Fásult (3) | Járás segítséggel (3) | kissé akadályozot t (3) | alkalom- szerű (3) | | |
| | | Részleges (2) | 31-60 év (2) | Nedves nyirkos(2) | Középsúlyos (2) | Rossz (2) | Zavart (2) | Kerekesszék szükségessé (2) | nagyon akadályozot t (2) | gyakori - vizelet (2) | | |
| | | Nincs (1) | 61 év felett (1) | Sérült, repedezett, allergiás (1) | Súlyos (1) | Nagyon rossz (1) | Kábult, öntudatlan (1) | Ágyban fekvő (1) | immobil (1) | teljes vizelet- széklet (1) | | |